



Ultrapasse todos os limites na erradicação de plantas daninhas de folhas largas.

## ADVERTÊNCIAS PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E MEIO AMBIENTE

- Não permita que menores de idade trabalhem na aplicação.
- Mantenha afastadas das áreas de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas.
- Use Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.
- Não desentupa bicos, orifícios ou válvulas com a boca.
- Primeiros socorros e demais informações, vide o rótulo e bula.
- Evite a contaminação ambiental, preserve a natureza.
- Não utilize equipamentos de aplicação com vazamentos.
- Não lave as embalagens ou equipamentos em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- As embalagens vazias deverão ser enxaguadas três vezes e a calda resultante acrescentada à preparação a ser pulverizada (tríplice lavagem).
- Descarte corretamente as embalagens e restos de produto. Não reutilize as embalagens vazias.
- Periculosidade ambiental e demais informações, vide rótulo, bula e receita.

Leia atentamente o rótulo, a bula e o Receituário Agrônomo, ou faça-o a quem não souber ler.

CONSULTE SEMPRE  
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.  
PRODUTO DE USO AGRÍCOLA.  
VENDA SOB RECEITUÁRIO  
AGRÔNOMICO.



\*Marca registrada de Dow AgroSciences.

SAVIEZZA

CÓD. 00199-3-1001-F3

DMA\* conduz o controle de plantas daninhas de folhas largas para o sucesso.



 Dow AgroSciences

[www.dowagrosiences.com.br](http://www.dowagrosiences.com.br)



 Dow AgroSciences



# DMA\*



- Herbicida seletivo e sistêmico de ação pós-emergente sobre as principais plantas daninhas de folhas largas.



## Benefícios:

- Controle de amplo espectro de plantas daninhas de folhas largas em pós-emergência.
- Controle complementar aos herbicidas residuais de pré-emergência.

## Recomendações:

- **Pré-emergência:** aplicar de 2,5-3,5 L/ha antes do rebrotamento da cana e do mato, quando o solo estiver úmido. Usar a dose maior para solos argilosos e a menor para solos arenosos.
- **Pós-emergência:** aplicar de 0,5-1,5 L/ha. Aplicar em época quente, quando a cana atingir 30-60 cm de altura.

## Plantas daninhas controladas:

Nome comum	Nome científico
Amendoim-bravo	<i>Euphorbia</i> spp
Beldroega	<i>Portulaca oleracea</i>
Caruru	<i>Amaranthus</i> sp
Carrapicho-de-carneiro	<i>Acanthospermum hispidum</i>
Cordão-de-frade	<i>Leonotis</i> spp
Corriola	<i>Ipomoea</i> spp
Dente-de-leão	<i>Taraxacum officinale</i>
Erva-moura (Maria-preta)	<i>Solanum nigrum</i>
Flor-roxa	<i>Echium plantagineum</i>
Guanxuma	<i>Sida</i> spp
Joá	<i>Solanum</i> spp
Jurubeba	<i>Solanum paniculatum</i>
Mamona	<i>Ricinus communis</i>
Mastruço (mentruz)	<i>Coronopus didymus</i>
Melão-de-São-Caetano	<i>Momordica charantia</i>
Mentrasto	<i>Ageratum conyzoides</i>
Mostarda	<i>Brassica campestris</i>
Nabiça	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Nabo-bravo	<i>Brassica rapa</i>
Picão-branco	<i>Galinsoga parviflora</i>
Picão-preto	<i>Bidens pilosa</i>
Poaia	<i>Richardia</i> spp
Serralha	<i>Sonchus oleraceus</i>
Trapoeraba	<i>Commelina</i> spp

Obs.: informações mais detalhadas encontram-se na bula do produto.

